

ស្ថានីយផ្លូវស៊ីលសត្វសមុទ្រ ក្នុងញ៉ាំង

ក្នុងញ៉ាំងជាស្ថានីយផ្លូវស៊ីលសត្វសមុទ្របុរាណ មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ទឹកថ្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ក្នុងនេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦ ហួសសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ោយប៉ែត នៅខាងស្តាំដៃចូលតាមក្លោងទ្វារវត្តក្នុងញ៉ាំង (រូបលេខ១)។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ក្រុមការងារសិក្សាផ្លូវស៊ីលរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន បានចុះពិនិត្យ និងសិក្សាបឋម។ ក្រោយមកទៀត ក្នុងញ៉ាំងនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិក្នុងញ៉ាំង ដោយមានអនុក្រឹត្យលេខ៦៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ដែលមានទំហំដី ១៩ហិកតា។

ក្នុងញ៉ាំងជាប្រភេទក្នុងកំប៉ោរ ត្រូវបានកំណត់អាយុកាលក្នុងស័កទី១ សម័យ Permian (២៥១-២៥៩លានឆ្នាំ)^១ ក្នុងញ៉ាំងមានលក្ខណៈជាផ្ទាំងថ្មកំប៉ោរធំៗដូចជញ្ជាំង ដែលមានការវត្តមួយនៅទីតាំងនោះផងដែរ។ នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃព្រះវិហារមានផ្ទាំងថ្មធំៗ គឺកើតឡើងដោយសារកំណកកំប៉ោរដែលបានពីសារធាតុកំប៉ោរនៃពពួកសត្វសមុទ្រ។ អតីតកាលដែលធ្លាប់ជាសមុទ្រកាលពីរាប់លានឆ្នាំមុន កំណកបានកកយ៉ាងក្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលអាចបង្កើតបានជាផ្ទាំងថ្មយ៉ាងក្រាស់ ដែលមានកសុតាងសត្វសមុទ្រមួយចំនួនកប់នៅក្នុងនោះ។ ការសិក្សានៅជាព័ត៌មានបឋមនៅឡើយ និងបានរកឃើញប្រភេទសត្វស៊ីលសត្វសមុទ្រមួយចំនួនដូចជា៖

១. ពពួកត្រីណូអ៊ីត Crinoid (Class Crinodea) ដែលក្រុមនេះស្ថិតនៅក្បែរពពួកផ្កាយសមុទ្រ (Class Ophiuroidea) និងពួកកាំប្រម៉ាសមុទ្រ (Class Cchinoidea) យើងក៏ធ្លាប់បានចុះផ្សាយលើកមុនផងដែរក្នុងគេហទំព័រ AMS អរិយធម៌ខ្មែរ។^២ ពពួកសត្វត្រីណូអ៊ីត ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងញ៉ាំងនេះ ត្រូវបានកប់ចូលក្នុងសាច់ថ្ម។ មានន័យថាពពួកនេះវាបានកើតមុនថ្មកំប៉ោរតាំងពីពេលថ្មកំប៉ោរនៅជាដីនៅឡើយ។ សំខាន់ត្រង់ថាកំណកនៃពពួកត្រីណូអ៊ីតនេះ មានចំនួនច្រើនលើសលប់ ដែលកកបង្កើតបានជាថ្មក្នុងញ៉ាំងក្រាស់

^១ General Department of Mineral Resource,2010, Geological Map of Cambodia

^២ <https://ams.com.kh/khmmercivilization/detail/7547>

អត្ថបទ៖ ស្ថានីយផ្លូវស៊ីលសត្វសមុទ្រ ភ្នំជញ្ជាំង

(រូបលេខ២)។ ពួកសត្វត្រីណូអ៊ីតនេះបានបន្តរស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន គ្រាន់តែពូជន៍ផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅមានផងដែរ។^៣

២- ផ្កាថ្ម ដែលរកឃើញនៅភ្នំបាក់នេះ ស្ថិតក្នុងសាខា Filum Cnidaria, ចំណាត់ថ្នាក់ Class Scleractinia^៤ មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្កាថ្មមួយចំនួនដែលមានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន(រូបលេខ៣)។

៣- ខ្យង យើងក៏បានរកឃើញប្រភេទខ្យងខ្លះ ដែលមាននៅតំបន់នោះផងដែរ គឺនៅចំណុចជើងភ្នំជញ្ជាំងបន្តទៅភ្នំបាក់(រូបលេខ៤)។ ខ្យងនោះ ស្ថិតនៅក្នុងសាខា នៃ Filum Mollusca ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ Class Gastropoda^៥ និងមិនទាន់កំណត់ឈ្មោះវាបាននៅឡើយ។ នេះក៏អាចបញ្ជាក់អំពីវត្តមានដ៏ចំណាស់នៃប្រភេទខ្យងសមុទ្រ មួយប្រភេទនេះលើតំបន់នៃភ្នំជញ្ជាំងផងដែរ។

៤- អាម៉ូនីត ជាប្រភេទសត្វដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលខ្យង យើងមិនទាន់មានពាក្យប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរនោះទេ។ ពពួកនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុង សាខា Filum Mollusca ជាមួយពពួកខ្យង និងលាសផងដែរ គ្រាន់តែខុសចំណាត់ថ្នាក់តែប៉ុន្មោះ ដែលហៅថា Class Cephalopoda។ អាម៉ូនីតដែលបានរកឃើញនៅភ្នំបាក់នេះ រកឃើញនៅផ្នែកខាងជើង នៃជើងភ្នំជញ្ជាំង មានទំហំប្រមាណ៤ស.ម និងមានស្នាមកន្ទុកដុំៗនៅលើសំបក មានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលខ្យងតែមានរាងសំប៉ែត(រូបលេខ៥)។

៥- អាម៉ូនីតមួយប្រភេទទៀត ដែលមានរូបរាងផ្សេងមានស្នាមផ្ទុកៗទទឹងខ្លួន មានទំហំប្រមាណ៨ស.ម ស្ថិតក្នុង Filum Mollusca និង Class Cephalopoda(រូបលេខ៦) ។

ចំណុចទាំងឡាយដែលបានបង្ហាញខាងលើជាផ្នែកមួយនៃព័ត៌មានបឋម ដែលបានរកឃើញក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផ្លូវស៊ីលនៅកម្ពុជា។ ភ្នំជញ្ជាំងជាស្ថានីយផ្លូវស៊ីលសត្វសមុទ្រ ដែលមានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះសម័យបុរាណ សម្រាប់ផ្នែក

^៣ <https://ams.com.kh/khmercivilization/detail/7547>

^៤ <https://www.digitalatlasofancientlife.org>

^៥ <https://www.digitalatlasofancientlife.org>

អត្ថបទ៖ ស្ថានីយផ្លុស៊ីលសត្វសមុទ្រ ក្នុងញ៉ាំង

វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអប់រំ និងការវិវត្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាំងពី
ទី១ Paleozoic ក្នុងសម័យ Permian (២៥១-២៥៥លានឆ្នាំ)។





រូបលេខ១៖ វត្តភ្នំជញ្ជាំង និងផ្ទាំងថ្មនៅខាងក្រោយ



រូបលេខ២៖ កំណកផ្លូវស៊ីល ត្រីណូអ៊ីត ក្នុងថ្មកំបោរ



រូបលេខ៣៖ ផ្កាថ្ម



រូបលេខ៤៖ ខ្យង



រូបលេខ៥៖ អាម៉ូនីត



រូបលេខ៦៖ អាម៉ូនីត

អត្ថបទដោយ៖ លីម វណ្ណច័ន្ទ